

Tipo de agente (Hongos)	Precauciones recomendadas
<i>Blastomyces dermatitidis</i>	BSL 2 y ABSL 2: Actividades con material clínico, tejidos de animales, cultivos, muestras ambientales y animales infectados
<i>Coccidioides immitis</i>	BSL 2: Uso de especímenes y al procesar tejido animal.
	ABSL 2: Estudios en animales cuando la ruta es parenteral.
	BSL 3: Uso de cultivos de espores identificados con el agente y materiales ambientales que tienen la infección arthroconidia.
<i>Cryptococcus neoformans</i>	BSL 2 y ABSL 2: Actividades con material clínico, ambiental o cultivos, y experimentos con animales infectados.
<i>Histoplasma capsulatum</i>	BSL 2 y ABSL 2: Manejo y procesamiento de especímenes clínicos, tejido animal y cultivos de moho, cultivos identificados en rutinas de diagnóstico y estudios en animales cuando la ruta es parenteral.
	BSL 3: Uso de cultivos identificados, material ambiental u otros que contengan infección conidia.
<i>Sporothrix schenckii</i>	BSL 2 y ABSL 2: Actividades con animales infectados. Se deben usar guantes al manejar animales infectados y cultivos que resulten en contaminación.
<i>Miembros patógenos del género Epidermophyton, microsporum, trichophyton</i>	BSL 2 y ABSL 2: Se recomienda cuando se experimenta con animales con dermatofytes. Se deben usar guantes al manejar animales infectados.
<i>Mohos misceláneos</i>	BSL 2: Uso al manipular cultivos que contengan el agente.