

Medición del sufrimiento en roedores y conejos.

(Buckwell T, en: Dolan K. *Ethics, animals and science*. Blackwell Science: Great Britain, 1999; p 160).

	Leve	Moderado	Grave
PESO corporal	Sin ganancia de peso	Pérdida del 20% de su peso corporal	Pérdida del 25% o más de su peso corporal
INGESTA Y TOMA DE AGUA	Consumen un 25% menos de lo normal, durante 72 h.	Consumen un 40% menos de lo normal durante 72 h.	Consumen un 60% menos de lo normal por 7 días o muestran anorexia por 72 h.
PIEL	Piloerección parcial.	Pelo erizado o marcada piloerección. Nariz, orejas y manos pálidas.	Pelo erizado y deshidratación. Nariz, orejas y manos pálidas y frías.
ACTITUD	Deprimido, pero responde normalmente a los estímulos	Deprimido, con respuestas débiles a los estímulos. Poca interacción con sus compañeros.	Indiferente, no responde a estímulos, ni a la manipulación.
POSTURA	Encogido ocasionalmente	Encogido frecuentemente.	Encogido con aspecto "paralizado" o inmóvil.
VOCALIZACIONES	Ocasionales	Frecuentes	Vocaliza aún sin que se le toque ni estimule.
DESCARGAS ÓCULO-NASALES	Leves u ocasionales	Persistentes	Persistentes y evidentes
RESPIRACIÓN	Normal o taquipnea	Respiración alterada ocasionalmente. Patrón respiratorio anormal.	Disnea o respiración anormal.
TEMBLORES	Ocasionales	Frecuentes, con postraciones transitorias (de < 1 h)	Persistentes. Postraciones > 1 h, automutilación. Convulsiones.